


Туберкулез

Туберкулез – это тяжелое заболевание с высокой степенью смертности. В конце 19 века Кох открыл туберкулезную палочку (микобактерию), вызывающую туберкулез.



Профилактика туберкулеза

Предупреждение туберкулеза ведется с помощью поголовной БЦЖ-вакцинации при рождении. Повторные введения вакцины против туберкулеза осуществля-

ются в дошкольный и школьный период.

**Заразиться
туберкулёмом может
каждый**



**Развитию туберкулёза
способствуют:**

1. Недостаточное и неправильное питание.
2. Плохие бытовые условия.
3. Стressовые ситуации.
4. Курение.
5. ВИЧ / СПИД.
6. Алкоголизм, наркомания, токсикомания.
7. Хронические заболевания (лёгких, сахарный диабет, язвенная болезнь).

**Симптомы, характерные
для туберкулеза:**

1. Кашель в течение 3-х недель и более.
2. Периодическое повышение температуры тела.
3. Общее недомогание и слабость.
4. Потеря аппетита, потеря веса.
5. Потливость по ночам.
6. Боли в грудной клетке.
7. Кровохарканье.

Помните! Своевременно выявленный туберкулёт – ИЗЛЕЧИМ!

Как предупредить туберкулёт? Обращайте внимание на своё самочувствие. Кашляющий человек может оказаться больным туберкулёмом. Если вы видите, что ваш родственник, знакомый или сослуживец долгое время кашляет, настаивайте на том, чтобы он обратился к врачу. **Пыльные, сырьи, непроветриваемые помещения благоприятствуют распространению туберкулённых бактерий.** Для профилак-